

# Herken de Moshommel

## Over de moshommel

### Voorkomen

Deze bedreigde soort komt vooral voor in kustgebieden, met name het waddengebied en de Delta. Vochtige gebieden hebben de voorkeur.



### Waardplanten

Onder andere gewone smeerwortel, klavers, lathyrussen, wikkes, hondsdrif, distels en grote kaardenbol.

### Nestgelegenheid

Aan de oppervlakte tussen de dichte vegetatie, in droge grassen of mos.

### Vliegtijd

maart - september

### Behoud

Behoud en ontwikkeling van bloemrijke velden en bermen. Het juiste maaibeheer en het inzaaien en aanplanten van waardplanten helpen hierbij.

## Uiterlijk

De moshommel heeft een roodbruin borststuk en een bruingeel achterlijf. Op het borststuk en het achterlijf zijn geen zwarte haren aanwezig. Vrouwtjes (koninginnen en werksters) en mannetjes (darren) hebben een zeer vergelijkbaar uiterlijk.

### Moshommel versus akkerhommel

De moshommel lijkt erg veel op de akkerhommel.

De akkerhommel heeft echter zwarte haren op het borststuk en achterlijf. Bij de donkere vorm van de akkerhommel is dit beter zichtbaar dan bij de lichte vorm. Nog een verschil is dat de beharing van het borststuk netter is bij de moshommel, terwijl de akkerhommel een ruigere beharing heeft.



*moshommel* ♀



*lichte akkerhommel* ♀

## Wat kan ik doen om de moshommel te helpen?

**Leefgebied creëren in je tuin** - Plant of zaai waardplanten, zoals klavers, veldlathyrus en vogelwikke. Laat paardenbloemen staan, deze worden in het voorjaar veel door hommelmannelingen bezocht.

**Let op met maaien** - Maai niet te dicht bij de grond, zodat je geen hommelnesten kapotmaakt. Laat altijd een stukje hoge vegetatie staan, zodat er het hele seizoen voedsel en schuilgelegenheid is.

